



## **Czy można zaszczepić się dwiema różnymi szczepionkami?**

---

**STANOWISKO Nr 5  
FORUM NAUKOWEGO COVID-19  
NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ  
z dnia 21 czerwca 2021 r.**

**w sprawie możliwości kontynuacji schematu szczepień przeciwko COVID-19 preparatem innej firmy**

Zgodnie z CHPL szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca oraz bieżącym doświadczeniem klinicznym, jeśli po podaniu 1-szej dawki szczepionki w ciągu 30 dni wystąpił poważny odczyn poszczepienny, definiowany jako niezamierzone i niepożądane zdarzenie lub stan pogorszenia zdrowia, zaistniały podczas lub po interwencji medycznej, należy wstrzymać podanie 2-giej dawki tego preparatu.

Jedna dawka szczepionki AstraZeneca nie chroni przed zakażeniem COVID w dostatecznym stopniu. Aktualne publikacje wskazują na możliwość kontynuacji rozpoczętego preparatem AstraZeneca schematu szczepień, preparatem Pfizer/BioNtech, co jest skuteczne i bezpieczne.

Kontynuacja rozpoczętego cyklu szczepień preparatem Pfizer, w trybie off-label, wymaga zgody pacjenta i lekarza.

Termin podania 2-giej dawki powinien zmieścić się w 12 tygodniach od podania pierwszej dawki.

Powyższe postępowanie jest niestandardowe, dlatego proponuje się ocenę stężenia przeciwciał poszczepiennych 4-6 tyg. po podaniu dawki szczepionki Pfizer.

Przewodniczący Forum  
Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

